

コムクロ[®]シャンプーの 使用方法

- 1日1回、**乾いた頭皮の患部**を中心に塗ります
- ▲コムクロ[®]シャンプーは、乾いた頭皮に使用してください。
- 洗髪の約**15分前**にコムクロ[®]シャンプーを患部に塗布し、洗髪時に泡立ててから洗い流します

- コムクロ[®]シャンプーを洗い流すために、ほかのシャンプーをあわせて使用する必要はありません

STEP 1

コムクロ[®]シャンプーを必要量手に取ります



①広げた手のひらにお薬を出します。



②その後、反対側の指でお薬を取ります。



使用量の目安

500円玉3枚分で、成人の頭皮全体に塗ることができます。これを超えないようにしてください。

STEP 2

コムクロ[®]シャンプーを**乾いた頭皮の患部**を中心に塗ります



- ①指で取ったお薬を、医師から指導された箇所に塗ってください。
- ②**頭皮の患部**にすべてに塗った後、爪を立てずにこすらずおだやかに患部になじませてください。塗り終えた後は、手をよく洗ってください。

ご注意

頭皮以外の患部や症状のない部位には使用しないでください。



お子様が1人で適切に塗れない場合は、保護者の方が代わりに塗ってください。

STEP 3

患部に塗ってから、**15分間**そのまま待ちます



15分間待つ場所は、浴室の外でも、中でもどちらでも構いません。

ご注意

15分間の待ち時間中に目、粘膜、傷口などにお薬が触れないように十分注意してください。



浴室内など室温の高い場所では、汗をかいてお薬が垂れやすくなる可能性がありますので、目やまぶたに付かないように注意してください。

STEP 4

お湯または水をかけて、爪を立てずやさしくよく泡立てます



お薬を塗り終わって15分間経ったら、指の腹を使ってやさしく泡立ててください。

ご注意

強くゴシゴシと洗わないでください。こすったり搔くことで症状が悪化することがあります。

STEP 5

お薬の流し残しのないように頭皮、手、全身を十分に洗い流します



ご注意

洗い流す際、お薬が目に入らないように、ご注意ください。万が一、目に入ったり、まぶたに付いた場合はすぐ洗い流してください。



コムクロ[®]シャンプーはステロイド外用剤です。したがって、他のステロイド外用剤を自己判断で洗髪直後に頭部に使用することは避け、医師の指示に従ってください。

🚫 使用上の注意事項

頭皮以外の患部や症状のない部位には使用しないでください。



開封後、6ヵ月以上経過したものは使用しないでください。



お子様が、ご自分で使用される場合には、正しく使用されているか保護者の方がご確認ください。



15分間の待ち時間中に目、粘膜、傷口などにお薬が触れないように十分注意してください。



乾燥機能付きの浴室など、高温になる場所で保管しないでください。



洗い流した後、耳の後ろなど、流し残しがないか、ご確認ください。



医師の指示なしに、ご自身の判断で使用を中止しないでください。



一般のシャンプーなどと区別して保管してください。処方されていないお子様の手の届かない場所に保管してください。



誤ってコムクロ®シャンプーを口に含んだ場合には、すぐに口をすすいでください。



このような場合は
医師・薬剤師に
お伝えください

- 以前にお薬を使用して、かゆみ・発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- 頭部に細菌・真菌などによる皮膚感染症、じゅくじゅくした傷、やけどなどがある。

- 妊婦または妊娠している可能性のある方、授乳中の方
- 下記のような症状があらわれたら、使用をやめてすぐに医師の診察を受けてください。
→ 頭痛、目のかすみ、目の痛み、かゆみ・発疹などのアレルギー症状